

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 27 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
VIA ORAL**



Setembro/2019

OBJETIVO: Obter uma resposta farmacológica adequada, ação sistêmica moderada e/ou quando outras vias não são indicadas.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.

- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Bandeja, medicamento prescrito, copo descartável e água.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos conforme o POP;
- Preparar a bandeja;
- Verificar os 12 certos (paciente, prescrição, medicamento, dose, via, apresentação, validade, data/horário, ação, efeito, registro e direito a recusa);
- Realizar a desinfecção da bandeja com álcool 70%, e reunir o material a ser utilizado;
- Colocar o medicamento no copo descartável sem tocá-lo;
- Usar seringa ou medidor para medicamentos líquidos;
- Informar ao cliente sobre o procedimento;
- Oferecer a medicação ao cliente, com a água para ajudar na deglutição;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 27 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
VIA ORAL**

Setembro/2019

- Permanecer ao lado do cliente até que este degluta todo o medicamento;
- Desprezar resíduos e manter o local organizado;
- Higienizar as mãos;
- Registrar o procedimento e observações no prontuário do cliente.

OBSERVAÇÕES:

- Evitar conversar durante o processo de preparação de medicamentos;
- Se não conhecer o medicamento ou tiver dúvida sobre o mesmo, procurar o enfermeiro do serviço;
- Preparar o medicamento a ser administrado na presença do cliente;
- Em caso de lactente, levantar a cabeça, empurrar o queixo para baixo até a abertura da boca, e colocar a seringa no canto da boca, derramando lentamente a medicação;
- Em cliente com SNE/SNG, triturar a medicação, diluir em água e aspirar com seringa de 20 ml. Realizar lavagem da sonda antes e após administrar o medicamento com 20 ml de água.

FATORES DE RISCO DO POP: Físico.