

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 28 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
VIA OCULAR**



Setembro/2019

OBJETIVO: Aplicação de medicamentos nos olhos, em forma de colírio ou pomada, visando o suporte terapêutico.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco e luva.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.

- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Bandeja, medicamento prescrito, fita adesiva, gaze estéril, hastes flexíveis com algodão na ponta, solução fisiológica 0.9%, espátula, compressa estéril, tampão ocular (se necessário).

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos conforme o POP;
- Verificar os 12 certos (paciente, prescrição, medicamento, dose, via, apresentação, validade, data/horário, ação, efeito, registro e direito a recusa);
- Reunir o material necessário;
- Explicar ao cliente e ao acompanhante o procedimento e informar o medicamento a ser administrado;
- Agitar medicamentos líquidos antes da administração para garantir sua distribuição uniforme;
- A tampa deve ser mantida com a face interna voltada para cima para evitar contaminação;
- Limpar os olhos do cliente com uma gaze umedecida com solução fisiológica 0.9%, do ângulo interno ao ângulo externo;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 28 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
VIA OCULAR**

Setembro/2019

- Inclinar a cabeça do cliente um pouco para trás, e solicitar que o mesmo olhe para um objeto no teto;
- Puxar para baixo a pele periorbitária com o dedo indicador, expondo o saco conjuntival e pingando a medicação;
- Aplicar pomadas oftalmológicas ao longo da crista inferior do saco conjuntival, do ângulo externo para o ângulo interno do olho, utilizando preferencialmente gaze estéril, hastes flexíveis com algodão na ponta ou espátula;
- Solicitar que o cliente feche os olhos e faça movimentos giratórios do globo ocular, após aplicação da medicação (colírio ou pomada);
- Retirar o excesso do colírio ou pomada com gaze ou hastes flexíveis com algodão nas pontas, do ângulo interno para o ângulo externo do olho;
- Solicitar que o cliente permaneça na posição por algum tempo, para que a medicação penetre;
- Deixar o cliente em posição confortável;
- Recolher o que deve ser guardado e desprezar o restante do material utilizado no lixo apropriado;
- Higienizar as mãos;
- Registrar na folha de observações complementares de enfermagem e comunicar ao enfermeiro aspectos relacionados a recusa, reações do cliente, dor e presença de secreção.

FATORES DE RISCO DO POP: Físico e biológico.