

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 38 - RETIRADA DO CATETER VESICAL DE DEMORA

Setembro/2019



OBJETIVO: Permitir a retomada das funções fisiológicas normais do aparelho urinário.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco, óculos, máscara e luvas.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Bandeja ou cuba-rim, biombo se necessário e seringa descartável de 20 ml com bico.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Explicar o procedimento a ser realizado e a sua finalidade ao cliente, obter o seu consentimento e realizar exame físico específico;
- Higienizar as mãos conforme o POP específico;
- Reunir os materiais necessários;
- Colocar os materiais sobre a mesa;
- Colocar biombo se necessário;
- Paramentar-se com os EPIs;
- Clientes do sexo masculino: posicionar o cliente na maca com lençol descartável na posição em decúbito dorsal, com os membros inferiores estendidos e afastados;
- Clientes do sexo feminino: posicionar a cliente na maca ginecológica com lençol descartável em posição ginecológica;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 38 - RETIRADA DO CATETER VESICAL DE DEMORA

Setembro/2019

- Expor a região genital;
- Clampear a extensão do sistema de drenagem;
- Retirar a fixação do cateter;
- Conectar a seringa ao lúmen lateral do cateter e aspirar toda a água destilada do balonete;
- Comunicar ao cliente o momento da retirada do cateter;
- Iniciar a retirada do cateter de maneira lenta e contínua até a sua completa exteriorização;
- Recolher os materiais;
- Retirar os EPIs;
- Recompor o cliente;
- Desprezar os lixos descartáveis e infectantes adequadamente;
- Dar destino adequado aos materiais encaminhando ao expurgo;
- Higienizar as mãos conforme o POP específico;
- Realizar as anotações de enfermagem constando hora da retirada do cateter, características da urina drenada, ocorrências adversas e as medidas tomadas.

FATORES DE RISCO DO POP: Biológico e físico.