

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM  
**POP 77 - COLETA DE ESCARRO - BACILOSCOPIA**

Setembro/2019



**OBJETIVO:** Consiste em realizar uma coleta adequada do escarro, para identificar o mais rápido possível os casos bacilíferos de Tuberculose Pulmonar para tratamento precoce da patologia e interrupção da cadeia de transmissão.

**EPI's NECESSÁRIOS:** Óculos, jaleco, máscara e luvas.

**RESPONSABILIDADES:**

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.

- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

**MATERIAIS:** Frasco coletor estéril, saco plástico e fita adesiva.

**PASSO A PASSO DE TRABALHO:**

- Identificar o paciente sintomático respiratório;
- Entregar ao mesmo o pote com identificação (nome completo, data de nascimento e data da coleta) fixa por fita adesiva;
- Coletar a primeira amostra sempre na unidade;
- Orientá-lo a ir para um local aberto e bem arejado em condições adequadas de biossegurança (quintal da unidade);
- Respirar fundo de 8 a 10 vezes, tossir profundamente e escarrar no frasco, sem encostar os lábios no pote ou tocar a parte interna com os dedos, pois há o risco de contaminação da amostra;


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM  
**POP 77 - COLETA DE ESCARRO - BACILOSCOPIA**

Setembro/2019



Fonte: [lacen.saude.pr.gov.br](http://lacen.saude.pr.gov.br)

- Preencher no mínimo 1,5 cm do frasco com escarro;
- Orientar o cliente que ao coletar a 2ª amostra, pela manhã imediatamente após acordar, eliminar o material de drenagem nasal que estiver presente;
- Caso o paciente use próteses dentárias, ele deverá retirá-las antes de higienizar a cavidade oral, escovar os dentes e a lateral da boca e lavar com bastante água (não usar creme dental);



Fonte: [lacen.saude.pr.gov.br](http://lacen.saude.pr.gov.br)

- Ir para um local aberto e bem arejado em condições adequadas de biossegurança;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM  
**POP 77 - COLETA DE ESCARRO - BACILOSCOPIA**


Setembro/2019

- Orientar o paciente a respirar fundo de 8 a 10 vezes, tossir profundamente e escarrar no frasco, sem encostar os lábios no pote ou tocar a parte interna com os dedos, pois há o risco de contaminação da amostra;
- Preencher no mínimo 1,5 cm do frasco com escarro;



Fonte: [lacen.saude.pr.gov.br](http://lacen.saude.pr.gov.br)

- O paciente deve transportar o pote com o escarro no saco plástico até a unidade de saúde ou ao laboratório, protegido da luz solar, idealmente, em 2 horas do momento da coleta. Na impossibilidade de levar o material em até 2 horas, o paciente deve acondicionar o material na geladeira até a entrega na unidade de saúde ou laboratório, preferencialmente no mesmo dia da coleta;



Fonte: [lacen.saude.pr.gov.br](http://lacen.saude.pr.gov.br)

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM  
**POP 77 - COLETA DE ESCARRO - BACILOSCOPIA**

Setembro/2019

- Na UBS receber a amostra, acondicionar o pote em geladeira (2 a 8°C) específica para materiais biológicos até o seu transporte para o laboratório.
- Lançar no livro de sintomático respiratório;
- Higienizar as mãos;
- Registrar no prontuário eletrônico do paciente;
- Acionar imediatamente o Distrito Sanitário para buscar a amostra.

**OBSERVAÇÃO:** Dentro da unidade de saúde, durante todo o período de atendimento de sintomáticos respiratórios ou de casos que ainda têm baciloscopia positiva, o profissional deve usar a máscara de proteção respiratória (N95 ou PFF2).

**FATOR DE RISCO DO POP:** Biológico.