

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA  
**POP 101 - AVENTAL DE USO CLÍNICO**

Janeiro/2020

**OBJETIVO:** Manter o avental limpo e livre de contaminação.

**EXECUTANTE:** Equipe de saúde bucal.

**ÁREA:** Higienização e desinfecção.

**MATERIAIS:** Hipoclorito de sódio 2,0% a 2,5%, água e sabão.

**FREQUÊNCIA:** A cada 02 dias ou sempre que apresentar sujidades visíveis.

**PASSO A PASSO DE TRABALHO:**

- Acondicionar o avental usado em um saco plástico fechado ao transportar para casa;
- Utilizar hipoclorito de sódio 2,0% a 2,5% (água sanitária), na quantidade de 10 ml (01 colher de sobremesa) de hipoclorito para 1 litro de água, deixando o avental de molho por 30 a 60 minutos;
- Ensaboar e esfregar o avental;
- Enxaguar até que não fique resíduo de sabão;
- Deixar secar em local arejado e apropriado;
- Passar o avental e guardar separadamente e acondicionado em saco plástico.

**OBSERVAÇÕES:**

- Os aventais de uso clínico podem ser lavados em lavadora de roupas, sempre após a hidratação e enxágue em água fria;
- Os aventais de uso clínico, depois de secos poderão ser passados a ferro para complementar a desinfecção, de acordo com o fabricante do tecido;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA  
**POP 101 - AVENTAL DE USO CLÍNICO**

Janeiro/2020

- Não transportar o jaleco pendurado em bolsas ou ombros;
- Antes de deixar o seu ambiente de trabalho, retire e acondicione o seu jaleco numa embalagem apropriada e que seja utilizada exclusivamente para esse fim;
- Nunca guarde jalecos usados junto aos limpos ou outras roupas e acessórios;
- Retirá-lo, dobrando-o pelo avesso;
- Proibido lavar o jaleco com outras roupas;
- O hipoclorito pode danificar o tecido se exposto além do recomendado (o hipoclorito é termossensível, é errado colocá-lo em água quente - maior que 35 graus -, pois perde sua função);
- Caso a máquina possibilite a lavagem das roupas em água aquecida, a desinfecção química é dispensável, bastando apenas a hidratação prévia da sujidade.