

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 26 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
VIA SUBCUTÂNEA



Setembro/2019

OBJETIVO: Obter uma resposta farmacológica adequada, ação sistêmica moderada e/ou quando outras vias não são indicadas.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco e luvas.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Bandeja, medicamento, algodão ou gazes, seringa 1 ml, agulha 13X4,5mm e agulha 40X12mm para aspirar.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos conforme o POP;
- Verificar os 12 certos (paciente, prescrição, medicamento, dose, via, apresentação, validade, data/horário, ação, efeito, registro e direito a recusa);
- Realizar a desinfecção da bandeja com álcool 70%, e reunir o material a ser utilizado;
- Preparar o medicamento utilizando a agulha de aspiração e a seringa de 1 ml;
- Retirar a agulha de aspiração e inserir a agulha 13 x 4,5 mm na seringa;
- Colar o rótulo de identificação na seringa do medicamento;
- Levar a bandeja até a unidade do cliente;
- Informar e explicar o procedimento ao cliente;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 26 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
VIA SUBCUTÂNEA

Setembro/2019

- Conferir o rótulo com os dados do cliente;
- Posicionar o cliente de forma adequada ao procedimento;
- Escolher o local de aplicação (região posterior do braço, região abdominal, região frontal lateral das coxas, região superior externas das nádegas);
- Fazer a higienização do local, se necessário;
- Pinçar com os dedos a pele do local de administração. A posição correta das mãos no instante de aplicar a injeção é a seguinte: a seringa deve estar posicionada entre o polegar e o indicador da mão dominante, e o profissional deve segurar a seringa como se fosse um dardo;
- Inserir em um único movimento a seringa com a agulha 13 x 4,5 mm no tecido subcutâneo em um ângulo de 45 °;
- Injetar lentamente o medicamento com a mão oposta que segura a seringa (soltar a prega do tecido);
- Retirar a agulha e a seringa em um movimento rápido;
- Aplicar leve compressão ao local com gaze;
- Recolher o material utilizado, deixando o local organizado;
- Descartar o material perfurocortante na caixa específica sem desconectar a agulha da seringa e sem reencapá-la;
- Realizar a desinfecção da bandeja com álcool 70%;
- Retirar a luva de procedimento;
- Higienizar as mãos conforme o POP;
- Checar o horário da administração do medicamento na prescrição médica;
- Fazer anotação de enfermagem.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 26 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
VIA SUBCUTÂNEA**

Setembro/2019

OBSERVAÇÕES:

- Na administração de insulina não realizar massagem após aplicação, para evitar a absorção rápida;
- A medicação deve ser feita longe de áreas vermelhas, cicatrizes, inflamações, hernias, feridas cirúrgicas ou inflamações;
- Realizar rodízio do local de aplicação.

FATORES DE RISCO DO POP: Biológico e físico.